

الفصل الرابع

عرض النتائج

مناقشة النتائج

مرض النكاح


الجدول رقم (١-٤): يوضح الفئة العمرية

العمر	التكرار	النسبة المئوية %
25-15	68	%34.0
35-25	65	%32.5
45-35	44	%22.0
45 فأكثر	23	%11.5

الشكل رقم (١-٤): يوضح الفئة العمرية

الجدول رقم (٤-٢): يوضح النوع


النوع	التكرار	النسبة المئوية %
نكر	98	%49.0
أنثى	102	%51.0



الشكل رقم (٤-٢): يوضح النوع

الجدول رقم (٤-٣): يوضح المستوى التطبيقي

المستوى التطبيقي	التكرار	النسبة المئوية %
أمي	22	%11.0
ثانوي	23	%11.5
جامعي	89	%44.5
أخرى	66	%33.0




الشكل رقم (٤-٣): يوضح المستوى التطبيقي

الجدول رقم (٤-٤): يوضح استخدام هذه النباتات من قبل

الجدول رقم (٤-٤): يوضح استخدام هذه النباتات من قبل


النبات	الكرندي	الكرم	أوراق الشاي	الريحان	الحزا	الضرمسة	الحبة السوداء	النضاع	أم شويكة	لكتيل الجبل
التكرار	49	16	12	12	21	12	22	39	15	•
نسبة %	%24.7	%8.1	%6.1	%6.1	%10.6	%6.1	%11.1	%19.7	7.6	0



الشكل رقم (٤-٤): يوضح استخدام هذه النباتات من قبل

الجدول (٥-٤) يوضح استخدام الكركدي


النسبة %	التكرار	الغرض من استخدامه	النبات
43.1%	٢٢	علاج ارتفاع ضغط الدم	الكركدي
17.6%	٩	النزلة	
31.4%	١٦	علاج التهاب الصدر والكحة	
7.8%	٤	علاج الملاريا	



الشكل (٥-٤) يوضح استخدام الكركدي

الجدول (٦-٤) يوضح استخدام النعناع

النسبة %	التكرار	الغرض من استخدامه	النبات
45.2%	١٩	ألم البطن والجهاز الهضمي	النعناع
14.3%	٦	النزلة وكطارد للغازات	
19.0%	٨	التهابات الشعب الهوائية والصدر	
21.4%	٩	المغص الكلوي	



الشكل (٦-٤) يوضح استخدام النعناع

الجدول (٧-٤) يوضح استخدام الحزا

النسبة %	التكرار	الغرض من استخدامه	النبات
50%	١٤	التهاب اللثة والفم والأسنان	الحزا
32.1%	٩	التهاب الأنف	
17.9%	٥	المسالك البولية والحصوة	

تهاب اللثة والفم والأسنان

تهاب الأنف

المسالك البولية والحصوة

الشكل (٧-٤) يوضح استخدام الحزا

الجدول (٨-٤) يوضح استخدام أوراق الشاي


النسبة %	التكرار	الغرض من استخدامه	النبات
75%	٩	مطهر للجروح	أوراق الشاي
16.7%	٢	سوء الهضم	
8.3%	١	التهاب الصدر	



الشكل (٨-٤) يوضح استخدام أوراق الشاي

الجدول (٩-٤) يوضح استخدام أم شويكة

النسبة %	التكرار	الغرض من استخدامه	النبات
71.4%	١٠	حساسية الجسم	أم شويكة
21.4%	٣	جروح الجلد	
7.1%	١	ألم المعدة	



الشكل (٩-٤) يوضح استخدام أم شويكة


الجدول (١٠-٤) يوضح استخدام الريحان

النسبة %	التكرار	الغرض من استخدامه	النبات
31.6%	٦	التهاب العيون	الريحان
10.5%	٢	مطهر للجروح والحروق	
15.8%	٣	طارد للغازات	
42.1%	٨	التهاب الجلد	

الشكل (١٠-٤) يوضح استخدام الريحان

الجدول (١١-٤) يوضح استخدام الحبة السوداء


النسبة %	التكرار	الغرض من استخدامه	النبات
60%	١٢	التهاب اللثة	الحبة السوداء
10%	٢	الصداع والالام الراس	
15%	٣	المغص والالام المعده والدستاريا	
15%	٣	الم الرجلين	



الشكل (١١-٤) يوضح استخدام الحبة السوداء

الجدول (١٢-٤) يوضح استخدام الضريبة

النسبة %	التكرار	الغرض من استخدامه	النتائج
83.3%	١٠	علاج حصوة الكلى	الضريبة
8.3%	١	الم البطن والاسهالات	
8.3%	١	الرطوبة	



الشكل (١٢-٤) يوضح استخدام الضريبة


الجدول (١٣-٤) يوضح استخدام الكركم

النسبة %	التكرار	الغرض من استخدامه	النبات
78.6%	١١	البهق	الكركم
14.3%	٢	ألم الصدر	
7.1%	١	التهابات المفاصل	

الشكل (١٣-٤) يوضح استخدام الكركم

الجدول (٤-١٤) يوضح طريقة استخدام الكركدي


النسبة %	التكرار	طريقة الاستخدام	النبات
63.3%	٣١	غلي	الكركدي
22.4%	١١	نقع	
14.3%	٧	لبخ	



الشكل (٤-١٤) يوضح طريقة استخدام الكركدي

الجدول (١٥-٤) يوضح طريقة استخدام النعناع

النسبة %	التكرار	طريقة الاستخدام	النبات
76.9%	٣٠	غلي	النعناع
15.4%	٦	نقع	
7.7%	٣	لبخ	



الشكل (١٥-٤) يوضح طريقة استخدام النعناع


الجدول (١٦-٤) يوضح طريقة استخدام الحزا

النسبة %	التكرار	طريقة الاستخدام	النبات
14.3%	٣	غلي	الحز
33.3%	٧	نقع	
52.4%	١١	لبنج	

الشكل (١٦-٤) يوضح طريقة استخدام الحزا

الجدول (١٧-٤) يوضح طريقة استخدام أوراق الشاي

النسبة %	التكرار	طريقة الاستخدام	النبات
58.3%	٧	غلي	أوراق الشاي
41.7%	٥	نقع	
0.0%	٠	لبنج	



الجدول (١٧-٤) يوضح طريقة استخدام أوراق الشاي

الجدول (١٨-٤) يوضح طريقة استخدام أم شويكة

النسبة %	التكرار	طريقة الاستخدام	النبات
13.3%	٢	غلي	أم شويكة
33.3%	٥	نقع	
53.3%	٨	لبخ	

الشكل (١٨-٤) يوضح طريقة استخدام أم شويكة


الجدول (١٩-٤) يوضح طريقة استخدام الريحان

النسبة %	التكرار	طريقة الاستخدام	النبات
8.3%	١	غلي	الريحان
25.0%	٣	نقع	
66.7%	٨	لبخ	

الشكل (١٩-٤) يوضح طريقة استخدام الريحان

الجدول (٢٠-٤) يوضح طريقة استخدام الحبة السوداء

النسبة %	التكرار	طريقة الاستخدام	النبات
4.3%	١	غلي	الحبة السوداء
13.0%	٣	نقع	
82.6%	١٩	لبخ	



الشكل (٢٠-٤) يوضح طريقة استخدام الحبة السوداء

الجدول (٢١-٤) يوضح طريقة استخدام الضريسة

النسبة %	التكرار	طريقة الاستخدام	النبات
53.8%	٧	غلي	الضريسة
7.7%	١	نقع	
38.5%	٥	لبخ	

الشكل (٢١-٤) يوضح طريقة استخدام الضريسة


٢٢-٥) يوضح طريقة استخدام الكركم

النسبة %	التكرار	طريقة الاستخدام	النبات
50%	٨	غلي	الكركم
37.5%	٦	نقع	
12.5%	٢	ليخ	

الشكل (٢٢-٤) يوضح طريقة استخدام الكركم

الجدول (٢٣-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي للحزا


النسبة %	التكرار	الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي	النبات
76.2%	١٦	(١-٤) أيام	الحزا
23.8%	٥	(٥ أيام - أسبوع)	
0.0%	٠	(أسبوعين فأكثر)	



الشكل (٢٣-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي للحزا

الجدول (٢٤-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي للكردي


النسبة %	التكرار	الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي	النبات
81.6%	٤٠	(١-٤) أيام	الكردي
12.2%	٦	(٥ أيام - أسبوع)	
6.1%	٣	(أسبوعين فأكثر)	



الشكل (٢٤-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي للكردي

الجدول (٢٥-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي للنضاع

النسبة %	التكرار	الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي	النبات
73.7%	٢٨	(١-٤) أيام	النضاع
15.8%	٦	(٥ أيام - أسبوع)	
10.5%	٤	(أسبوعين فأكثر)	




الشكل (٢٥-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي للنضاع

الجدول (٢٦-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لأوراق

الشاي

النسبة %	التكرار	الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي	النبات
84.6%	١١	(١-٤) أيام	أوراق الشاي
7.7%	١	(٥ أيام - أسبوع)	
7.7%	١	(أسبوعين فأكثر)	



الشكل (٢٦-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لأوراق

الشاي

الجدول (٢٧-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لنبات

الريحان

النسبة %	التكرار	الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي	النبات
50.0%	٦	(١-٤) أيام	الريحان
50.0%	٦	(٥ أيام - أسبوع)	
0.0%	٠	(أسبوعين فأكثر)	



(١-٤) أيام



(٥ أيام - أسبوع)


(أسبوعين فأكثر)

الشكل (٢٧-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لنبات

الريحان

الجدول (٢٨-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لنبات أم شويكة

النسبة %	التكرار	الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي	النبات
53.3%	٨	(١-٤) أيام	أم شويكة
33.3%	٥	(٥ أيام - أسبوع)	
13.3%	٢	(أسبوعين فأكثر)	




الشكل (٢٨-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لنبات أم

شويكة

الجدول (٢٩-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لنبات

الكرم


النسبة %	التكرار	الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي	النبات
50.0%	٨	(١-٤) أيام	الكرم
31.3%	٥	(٥ أيام - أسبوع)	
18.8%	٣	(أسبوعين فأكثر)	



الشكل (٢٩-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لنبات الكرم

الجدول (٣٠-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لنبات الضريسة

النبات	الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي	التكرار	النسبة %
الضريسة	(١-٤) أيام	٧	%58.3
	(٥ أيام - أسبوع)	٢	%16.7
	(أسبوعين فأكثر)	٣	%25.0




الشكل (٣٠-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لنبات

الضريسة

الجدول (٣١-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لنبات الحبة السوداء

النبات	الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي	التكرار	النسبة %
الحبة السوداء	(١-٤) أيام	١٩	%79.2
	(٥ أيام - أسبوع)	١	%4.2
	(أسبوعين فأكثر)	٤	%16.7




الشكل (٣١-٤) يوضح الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي لنبات الحبة السوداء

الجدول (٣٢-٤) يوضح الشفاء التام عند استخدام النباتات الطبية تحت الدراسة

النسبة %	التكرار	هل تم الشفاء التام عند استخدام لهذا النباتات	النبات
27.3%	٤٨	نعم	الكرندي
2.9%	١	لا	
19.9%	٣٥	نعم	النعناع
11.8%	٤	لا	
8.0%	١٤	نعم	الحزا
20.6%	٧	لا	
6.8%	١٢	نعم	أوراق الشاي
0%	٠	لا	
8.5%	١٥	نعم	أم شويكة
0%	٠	لا	
6.3%	١١	نعم	الريحان

2.9%	١	لا	
9.1%	١٦	نعم	الحبة السوداء
52.9%	١٨	لا	
6.3%	١١	نعم	الضريسة
2.9%	١	لا	
8.0%	١٤	نعم	الكركم
5.9%	٢	لا	




الشكل (٤-٣٢) يوضح الشفاء التام عند استخدام النباتات الطبية تحت الدراسة

الجدول (٣٣-٤) يوضح الآثار الجانبية

النسبة %	التكرار	هل يوجد آثار جانبية	النبات
%22.2	٢	نعم	الكرندي
%25.1	٤٧	لا	
%55.6	٥	نعم	النعناع
%17.6	٣٣	لا	
%0.0	٠	نعم	الحزا
%11.2	٢١	لا	
%0.0	٠	نعم	أوراق الشاي
%6.4	١٢	لا	
%0.0	٠	نعم	أم شويكة
%8.0	١٥	لا	
%0.0	٠	نعم	الريحان

%6.4	١٢	لا	
%11.1	١	نعم	الحبة السوداء
%11.8	٢٢	لا	
%0.0	٠	نعم	الضريسة
%6.4	١٢	لا	
%11.1	١	نعم	الكركم
%7.0	١٣	لا	



الشكل (٣٣-٤) يوضح الآثار الجانبية

الجدول رقم (٤-٣٤): يوضح المصادر التي تقوم باستشارتها

إذا كانت الإجابة بلا وضح المصادر الأخرى التي تقوم باستشارتها	التكرار	النسبة المنوية %
التجربة السابقة	91	45.5%
خبير	50	25.0%
أخرى	59	29.5%
المجموع	200	100.0%

الشكل رقم (٤-٣٤): يوضح المصادر التي تقوم باستشارتها

مناقشة النتائج:

من خلال الدراسة التي أجريت على بعض النباتات التي تحتوي على الفلافونيدات في مدينة بربر وتم جمع هذه المعلومات عن طريق الاستبيان وتم تحليله ، وجد أن غالبية الفئات العمرية التي تستخدم هذه النباتات ما بين (٢٥-٣٥ سنة) واقلها من (٤٥ فأكثر) مما يدل أن اغلب عينة الدراسة من الشباب وقلة الكهول ، كذلك وجد أن النوع لعينة الدراسة كانت متقاربة جداً حيث ظهرت بنسبة (٥١%) إناث و(٤٩%) ذكور، إما من ناحية المستوى التعليمي لعينة الدراسة غالبيتهم مستواهم التعليمي جامعي واقلها مستواهم التعليمي أمني بنسبة (١١%) وذلك لتوافر البيانات التعليمي بهذه المدينة بمختلف مستوياتها ، كذلك وجد أن استخدام هذه النباتات بأنواعها المختلفة حيث ظهرت بنسبة متفاوتة جداً وذلك لتوافر تواجدها بهذه المدينة ، ووجود خلفية متوارثة عن الأجيال السابقة ، إما من ناحية العرض من الاستخدام ، فوجد استخدام الكركدي في علاج ارتفاع ضغط الدم بنسبة (٤٣.١%) وبعضهم يستخدموه لعلاج التهابات الصدر والكحة بنسبة (٣١.٤%) يستخدمونه في علاج الملاريا بنسبة (٧.٨%) ، وهذا الاستخدام يتطابق مع الدراسات الحديثة ، وكانت أكثر الطرق استخدام هي طريقة الغلي بنسبة (٦٣.٣%) وهذه الطريقة قد تفقده بعض الجواهر الفعالة أما في حالة النقع فكانت بنسبة (٢٢.٤%) أما في حالة اللبخ كانت بنسبة (١٤.٣%) وكان الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي من (١-٤) ايام كانت بنسبة (٨١.٦%).

كما يستخدم النعناع في علاج آلام البطن والجهاز الهضمي بنسبة (٤٥.٢%) ثم في

علاج التهاب الشعب الهوائية والصدر بنسبة (١٩%) ثم في علاج المغص بنسبة (٢١%)

ولأخيراً في علاج النزلة وطارده للغازات بنسبة (١٤.٣%) وأكثر طرق استخدامه الغلي بنسبة (٧٦.٩%) والنقع بنسبة (١٥.٤%) واللبخ بنسبة (٧.٧%) وكان الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي من (١ — ٤ أيام) بنسبة (٧٣.٧%) من (٥ أيام — أسبوع)، كانت بنسبة (١٥.٨%) ، واسبوعين فأكثر كانت بنسبة (١٠.٥%) ، ولا توجد لها الآثار الجانبية وقد تم الشفاء التام ، أما الحزا يستخدم في علاج التهاب اللثة وآلام الأسنان بنسبة (٥٠%) و التهاب الإذن بنسبة (٣٢.١%) وأخيراً في التهاب المسلك البولية والحصوة بنسبة (١٧.٩%) كانت الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي من (١ — ٤ أيام) بنسبة (٧٦.٣%) من (٥ أيام — اسبوع) كانت بنسبة (٢٣.٨%) كانت طريقة استخدامه غلي بنسبة (١٤.٣%) والنقع بنسبة (٣٣.٣%) واللبخ بنسبة (٥٢.٤%) لا توجد لديها آثار جانبية إما أوراق الشاي فوجد استخدامه كمطهر للجروح بنسبة (٧٥%) ثم في علاج سوء الهضم بنسبة (١٦.٧%) التهاب الصدر (٨.٣%) وكانت طريقة استخدامه بالغلي بنسبة (٥٨.٣%) والنقع بنسبة (٤٢.٧%) وكانت الزمن اللازم للحصول على الأثر العلاجي من (١ — ٤ أيام) بنسبة (٨٤.٦%)، ومن (٥ أيام — اسبوع) بنسبة (٧.٧%) ومن اسبوع فأكثر بنسبة ٧.٧% وكذلك استخدام أم شويكة في علاج الحساسية بنسبة (٧١.٤%) وفي علاج جروح الجلد بنسبة (٢١.٤%) وبعضهم يستخدمه في علاج ألم المعدة بنسبة (٧.١%) وكانت طريقة استخدامه للغلي بنسبة (١٣.١%) والنقع بنسبة

(%٣٣.٣) واللبخ (% ٥٣.٣) كانت الزمن اللازم للحصول على الاثر العلاجي (١ — ٤ أيام) بنسبة (%٥٣.٣) ومن (٥ أيام — أسبوع) بنسبة (%٣٣.٣) ومن اسبوعين فاكثر بنسبة (%١٣.٣) إما الريحان استخدمه في علاج التهابات الجلد بنسبة (%٤٢.١) ثم يليه إلتهاب العيون بنسبة (%٣١.٦) ثم كطارد للغازات بنسبة (%١٥.٨) وبعضهم يستخدموه كمطهر للجروح والحروق بنسبة (%١٠.٥) وإلتهابات الجلد بنسبة (%٤٢.١)، وكانت طريقة إستخدامه بالغلي بنسبة (%٨.٣) والنقع بنسبة (%٢٥) واللبخ بنسبة (%٦٦.٧) والزمن اللازم للحصول على الاثر العلاجي من (١ — ٤ أيام) بنسبة (%٥٠) ومن (٥ أيام — أسبوع) بنسبة (%٥٠) و أما الحبة السوداء يستخدمونها في علاج إلتهاب اللثة بنسبة (%٦٠) بعضهم في علاج الصداع وآلام الرأس بنسبة (%١٠) والبعض الآخر في المغص، والدسنتاريا (%١٥) وألم الرجلين بنسبة (%١٥) وكانت طريقة إستخدامه بالغلي بنسبة (%٤.٣) والنقع بنسبة (%١٣) واللبخ بنسبة (%٨٢.٦) والزمن اللازم للحصول على الاثر العلاجي من (١ — ٤ أيام) بنسبة (%٧٩.٢) من (٥ أيام — اسبوع) بنسبة (%٤.٢) ومن اسبوعين فاكثر بنسبة (%١٦.٧) إما الضريسة فاستخدمت في علاج حصوة الكلى بنسبة (%٨٣.٣) ثم يليه ألم البطن والإسهالات والرطوبة بنسبة (%٨.٣) وكانت تستخدم بالغلي بنسبة (%٥٣.٨) واللبخ بنسبة (%٣٨.٥)، والنقع بنسبة (%٧.٧) والزمن اللازم للحصول على الاثر العلاجي (من يوم — ٤ أيام) بنسبة (%٥٨.٣) ومن (٥ يوم — اسبوع) بنسبة (%١٦.٧) من أسبوعين فاكثر بنسبة (% ٢٥) أما الكركم فظهر إستخدامه في علاج

البهق بنسبة (٧٨.٦%) ويليهِ الم الصدر بنسبة (١٤.٣%) ثم أخيراً في علاج إلتهابات المفاصل بنسبة (٧.١%) وكانت تستخدم عن طريقة غلي بنسبة (٥٠%) والنقع (٣٧.٥%) واللبخ (١٢.٥%) والزمن اللازم للحصول على الاثر العلاجي (من يوم _____؛ أيام) بنسبة (٥٠%) من (٥يوم _____ اسبوع) بنسبة (٣١.٣%) ومن اسبوعين فأكثر بنسبة (١٨.٨%)، وهذه علامة واضحة على إن إستخدام معظم هذه النباتات في علاج الإلتهابات المختلفة والحصوات والأمراض الجلدية وذلك لسهولة الحصول على الأثر العلاجي.

إما من ناحية طريقة الإستخدام فوجدت اغلب هذه النباتات تستخدم عن طريق الغلي حيث نالت أعلى نسبة النعناع بنسبة (٧٦.٩%) وأقلاها الحبة السوداء بنسبة (٤.٣%) ، إما عن طريق اللبخ فنالت أعلى نسبة الحبة السوداء بنسبة (٨٢.٦%) وذلك نسبةً لإستخدامه الخارجي وأدنى نسبة في أوراق الشاي ، إما عن طريق النقع فنالت أوراق الشاي أعلى نسبة (٤١.٧%) وأخيراً الضريسة بنسبة (٧.٧%) لأنه يستخدم كمشروب داخلي .

كذلك وجد أن الزمن الذي يستغرقه هذه النباتات الطبية للحصول على الأثر العلاجي كانت أغلبها من (١-٤)أيام ، أقلها (إسبوعين فأكثر) مما يدل على إن إستخدام هذه النباتات لا يأخذ وقتاً طويلاً للحصول على الأثر العلاجي.

إما الحصول على الشفاء التام عند إستخدام تلك النباتات الطبية لهل العديد من المشاكل ولعلاج العديد من الأمراض معظم عينة الدراسة يرون الحصول على الشفاء حيث

ظهرت بنسبة (٥٢.٩%) في الحبة السوداء و بنسبة (٢٧.٣%) في الكركدي و بنسبة (٢٠.٦%) في الحزا (٨%)، و هذا يدل على أن هذه النباتات مفيدة جداً في العلاج .

كذلك وجد أن الآثار الجانبية لهذه النباتات الطبية غالبية عينة الدراسة لا يلاحظون أي آثار جانبية ، وبعضهم يرون بعض الآثار الجانبية مثل الكركدي يسبب الغثيان و يخفض الضغط ، وكذلك النعناع يسبب إستفراغ ولها طعم مر وذلك الكركم لها طعم مر شديد والحبة السوداء الذي يسبب الغثيان ومن هنا يتضح لنا عدم وجود أي آثار جانبية آخر من إستخدام مثل هذه النباتات الطبية.

وكذلك وجد أن إستشارة الطبيب عند إستخدام النباتات الطبية تبين لنا غالبية عينة لا يستشيرون الطبيب عند إستخدامهم مثل هذه النباتات بنسبة (٦٩%) والقليل منهم يستشيروا الطبيب بنسبة (٣١%) نسبة لعدم خطورة هذه النباتات الطبية نجد أن غالبية عينة الدراسة يميلوا للإستخدام الشعبي ولديهم معرفة عن الفائدة العلاجية للنباتات الطبية.

الفصل الخامس

التوصيات - المراجع - الخاتمة

التوصيات

١/ لفت نظر الجهات المسؤولة (وزارة الزراعة ، المركز القومي للبحوث ،

وزارة الصحة) من النباتات الطبية التي تحتوي علي فلافونيدات لماله من

دور فعال في الوقاية من الامراض

٢/ توجيه مزيد من الابحاث العلمية الي ما يخض الفلافونيدات (المركز

القومي للبحوث)

٣/لقاء الضوء علي الاستخدام الشعبي للنباتات الطبية كنواه للبحوث العلمية

المراجع

١/ جريدة الرياض د. جابر سالم www.Alriydh.com/630970، مؤسسة

اليمامة الصحية: 10:59 2017/5/4-

٢/ جريدة المرسال د. سهام احمد www.Almrsal.com/post/147721

5/4 12:43 2017

٣/ حسن بن الحازمي، كتاب الكيمياء العضوية، المنتدى الزراعي نت F-Zira

3A-net\t11290

٤/ محمد السعدي، خفايا وأسرار النباتات الطبية والعقاقير في الطب القديم

والحديث، عمان/الأردن شارع الملك حسين، دار البازودي العلمية للنشر

والتوزيع، ٢٠٠٦م ٦١٥.٣٢، ٨٨،

٥/ د/ سحر ملص، علم العقاقير والنباتات الطبية، عمان / الأردن شارع الملك

حسين، دار البازودي العلمية للنشر والتوزيع ٢٠٠٣م، ٦١٥.٣٢، ٨٩

٦/ د/ جمال الطيب بشرى الغزالي، كتاب النباتات الطبية المتداولة في ولاية

الخرطوم، معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية

الخاتمة

الحمد لله بصفاته العلى وأسمائه الحسنى جلالة المتعالى الذي يسرنا بإتمام إخراج
هذا البحث في صورته الحالية الذي يشمل كل التفاصيل
الخاصة بالفلافونيدات وإستخدامه العلاجي وتوضيح بعض الآثار الجانبية وطرق
الإستخدام الصحيح ، وكذلك شملت أمثلة لبعض النباتات الطبية التي تحتوي
على الفلافونيدات المستخدمة شعبيا" في مدينة بربر
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البحث ذو منفعة على المجتمع ، كما أن
يكون خير عون لكل طالب علم والله الموفق .



بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة الشيخ عبد الله البدري
كلية العلوم الصحية
قسم الصيدلة



دراسة فعالية الاستخدام الشعبي العلاجي لبعض النباتات التي تحتوي على الفلافونيدات
الاستبيان

1. العمر:

() 15-25 () 25-35 () 35-45 () 45 فأكثر ()

2. النوع:

ذكر () أنثى ()

3. المستوى التعليمي:

أساس () أمي () ثانوي () جامعي ()

الكرم	الضريسة	الحبة السوداء	الريحان	أم شويكة	أوراق الشاي	الحزا	النفعا	الكركي	النبات
									الغرض من الاستخدام
									الزمن اللازم للحصول على الشفاء التام
									هل تم الشفاء التام
									هل استخدمت النبات من قبل
									طريقة الاستخدام
									الآثار الجانبية



Date 11.7.2017

To whom it may concern

This to certify that the plants materials were taxonomically authenticated Maha Omar Sagadei at herbarium of Medicinal and Aromatic Plants & Traditional Medicine Research Institute (MAPIMRI), National center for Research, Khartoum, Sudan, and voucher herbarium samples were deposited there for further future reference.

Botanical name *Verbena terrestris* L. Family: Zygophylloceae Vern name: Dreisa

Botanical name *Lagotis cretica* L. Family: Zygophylloceae Vern name: UM Showeika

Botanical name *Curcuma tinctorius* L. Family: Asteraceae Vern name: kurkum

Botanical name *Hibiscus sabdariffa* L. Family: Malvaceae Vern name: karkade

Name: Abd Aihadey Yagoub Altayb

Elshaikh Abriella Elbadri Universiy


Hanan Habbal Elhasani

Head Dep. of phytocenistry

and plant taxonomy



Dr. Awwad Mohamed Mohamed
Director of Medicinal and Aromatic
Plants & Traditional Medicine Research Institute



Date 11 7.2017

To whom it may concern

This to certify that the plants materials were taxonomically authenticated Maha Omar Sagadei at herbarium of Medicinal and Aromatic Plants & Traditional Medicine Research Institute (MAPMRI), National center for Research, Khartoum, Sudan, and voucher herbarium samples were deposited there for further future reference.

Botanical name: *Camellia sinensis* L. Family: Theaceae Vern name: ALshai

Botanical name: *Ocimum basilicum* L. Family: lamiaceae Vern name: rehan

Botanical name: *Flapophyllum tuberculatum* (forssk) L. Family: Rutaceae Vern name: Elhazza

Botanical name: *Heliotropium paniculata* (forssk) L. Family: Acanthaceae Vern name: Elnenae

Botanical name: *Thapsia villosa* L. Family: Ranunculaceae Vern name: kamon asod

Name: Abd Alnadel Yagoub Altayb

ELshaikh Abdellah Elbadri Universiy


Hanan Hassab Elraouf

Head dep. of phytochemistry
and plant Taxonomy


Prof. Ahmed Mohamed
Director of Medicinal and Aromatic
Plants & Traditional Medicine Research Institute