

الباب الثالث القدم السكرية

مقدمة عن القدم السكرية .

خطي مريض (القدم السكري) باهتمام عالمي من قبل العلماء والباحثين حيث تشكل فرحة القدم السكرية احد اكثر مضاعفات داء السكري خطورة لكونها السبب الرئيسي لبتز الأطراف بين المصابين بداء السكري في العالم مرض خطير يصيب مريض السكر ويشكل احد اهم اسباب بقاء مريض السكر بالمستشفيات في اقسام الجراحة وقد يصيب حوالي 5-6% من مريض السكر النوع الثاني و 7% من مريض السكري فوق سن الستين وتشمل متلازمة القدم السكرية مجموعة من الامراض التي قد تحدث متجمعة او متفردة


من الأخطاء الشائعة استخدام مصطلح القدم السكري للإشارة فقط للمراحل المتأخرة للمريض مثل الغرغرينا و البتر . وذلك بالرغم من وجود العديد من المراحل التي تسبق هذه المرحلة المتأخرة بسنوات عديدة والتي غالبا لا تستدعي اهتمام المريض بسبب عدم معرفة بها ولأنها

غالبا ما تكون غير مصحوبة بالام او اعراض واضحة وسما هو جدير بالذكر ان المراحل الاولى لتأثيرات مريض السكري على القدم تكون هي الاسهل في الاكتشاف والعلاج اذا ما قورنت بمضاعفات مريض السكري الاخرى على العين تكون هي الاسهل في الاكتشاف والعلاج اذا ما قورنت بمضاعفات مريض السكري الاخرى على العين والكلية ولقد اثبتت الابحاث ان الاكتشاف المبكر لتأثيرات مرضي السكري على القدمين يمنع البتر بنسة قد تصل الى 80%

تعريف القدم السكرية :
القدم السكرية هي حالة طبية مزمنة عرض فيها القدم للضرر في تركيبها أو وظيفتها أو الاثنين معاً ، أو بسببها يمر مرض السكري

اعراض وعلامات القدم السكرية :-

١. برودة غير طبيعية بالقدمين
٢. اختفاء الشحم من تحت الساق والقدم
٣. اختفاء الشعر من جلد الساق والقدم
٤. يبدو جلد الساقين ناعماً ورقيقاً
٥. ضعف النبض في شرايين القدمين
٦. حدوث زيادة في سمك الأظافر
٧. حدوث السوداء بالأطراف والإصابع وكل القدم والساق
٨. حدوث التهابات وجروح متقيحة وغرغرينا
٩. الام مبرحة بالقدمين حتي أثناء الراحة
١٠. حدوث الام مبرحة خلف الساق عند المشي
١١. زيادة في الاحساس بالام والخدرة والسخونة في اطراف واصابع وباطن القدمين
١٢. جفاف الجلد لاختفاء العرق
١٣. وجود اصابات وجروح ملتهبة وغير مؤلمة
١٤. ضمور عضلات القدم الذي يؤدي الي حدوث تشوهات في شكل القدم



- الجروح التي لا تلتئم
- تورمات باجزاء من القدم خاصة السطح والباطن والاصابع والكاحل وبكل القدم خاصة اذا حدث ذلك في قدم واحد
- خروج صديد من القدم وهو علامة متأخره جدا
- التشوهات وتغيير شكل القدم مثل الاعوجاج
- انحراف القدم علي جهة معينة وتغيير شكل الاصابع والاعصاب الطرفية

مضاعفات السكري علي الجهاز العصبي :-

- الجهاز العصبي المركزي (المخ – النخاع الشوكي) ويشمل
- الغيبوبه السكرية
- الشلل النصفي

• الجهاز الطرفي ويشمل :-

- الاعصاب الطرفية للحركة الارادية
- الاعصاب الطرفية لنقل الاحساس الي المخ
- الاعصاب الطرفية الباطنية الذاتية العمل
- كل اجزاء الجهاز العصبي تحدث فيها مضاعفات السكري
- مضاعفات الاعصاب الطرفية للاحساس ويشمل :

- سخونة في باطن القدمين

• تشخيص مريض القدم السكرية :-

• متى نقول إن الشخص مصاب بمرض القدم السكرية

• القدم السكرية ليس مرضاً محدداً بل هو أحوال مرضية متعددة :-

اولاً :- تشخيص الاعراض :

مجرد وجود الاعراض التالية يعني بدأ الإصابة بالقدم السكرية

• ضعف وعدم الاحساس بالقدم

• الاحساس غير الطبيعي بالقدم مثل البرودة والسخونة بلا سبب

• صعوبة حفظ التوازن اثناء الوقوف والمشي

• الآلام المتكررة بالقدم بدون اصابات وجروح

ثانياً : تشخيص من العلامات :

• اذا ظهرت العلامات التالية بقدم المريض السكري فان يصبح حتماً

• مصاب بالقدم السكرية

• التقرحات

• الشقوق والقرح والبثور وعتامة الاظافر وتشققها

• الغرغرينا ذرقة وسواد بالاصابع والجوانب وباطن القدم

• تغيير لون جزء من القدم مثل ميلها الي الحمراء

• البياض المشابه لذلك الذي ينشأ عن غمرها في الماء لفترة طويلة وبياض مناطق ما بين الاصابع وظهور بقع لونية من لون خاصة الكعب

- الالام كوخز الابر في انحاء الجسم
- تنميل وخدر في الاطراف
- الالام مبرحة ليلا علي طول الساق
- الاصابات والجروح المتقيحة في القدمين
- الاعصاب الطرفية للحركة الارادية ويشمل :-
- شلل العصب السابع للوجه ويشل حركة الوجه
- ضمور العضلات بالفخذ والساقين والقدمين
- الاعصاب الطرفية الذاتية العمل ويشمل :-
- اختلال الرؤية
- اسهال ليلي متكرر
- عرق جزني في بعض مناطق الجسم
- عجز جنسي
- انخفاض ضغط الدم الوضعي
- احمرار باطن القدمين
- اختلال البلع

الوقاية من القدم السكرية :-

يجب توفير الآتي :-

• فحص قدميك يوميا وتأكد من عدم وجود أي جروح أو فقاقيع
و استعمال حذاء راحة أرجلكم بباطن القدم

• استعمال قفازات القطن الدافئة ونحاشي استعمال الماء البارد
والساخن

• جفف قدميك جيدا خاصة بين الأصابع

• ادهن قدميك جيدا بدهان يوصف لك الطبيب حذرا من الدهانات
الكاوية

• لا تدع الدهانات يتراكم بين الأصابع ادلك جيدا

• لبس حذاء رطب نظيفة من القطن والصوف

• قلم الاظفار يوميا مع احد يساندك

• يستعمل حاكاة لإزالة القشور وعين السمكة ولا تستعمل الموس
والمقص

• اختر حذاء مناسبا ومريحاً للقدم واسع من الامام وبدون سيور
خاصة بين الأصابع

• نحس باطن الحذاء قبل لبس الحذاء تأكد من عدم وجود اجسام
غريبة او نتوءات بالحذاء

• تأكد دائما عند زيارتك الطبيب انه قد قام بالكشف علي قدميك
تماما وبصورة جيدة

• علاج القدم السكرية :-

• طرق العلاج والتحكم الجيد في السكري وضغط الدم والدهون

• إزالة الضغط عن القدم في حالات حدوث قرحة وهذا اهم خطوة نحو علاج القدم السكري ولذلك لاتاحة الفرصة لالتام الجروح ومنها التقليل من الوقوف والمشي واستخدام احذية خاصة تفصيل قوالب داخلية للاحذية

• تعديل سريان الدم وعلاج انسداد الاوعية الدموية إن وجد لتحسين مستوى تروية دموية الجرح وعلاج الالتهابات الجرثومي عن طريق معالجتها بواسطة :-

• المضادات الحيوية المناسبة

• إزالة الانسجة الملتهبة والخلايا الميتة والتعفنة

• تنظيف وتضميد الجروح والقرح وإزالة الجلد القاسي

• مراقبة الجروح بصورة منتظمة

• علاج القدم السكرية بالاكسجين O2 :-

العلاج بالاكسجين يكون تحت ضغط جوي من خلال تنفس المريض للاوكسجين النقي المركز بنسبة 100% مقارنة مع كمية الاوكسجين الموجود أو في الطبيعة تبلغ نسبته 21% تحت ضغط جوي اعلي من الضغط الجوي العادي والذي بسبب دوره ذوبانه اكثر واسرع بالاكسجين في الدم .

من البداية عند دخول المريض في الغرفة الخاصة لابد من الضغط الجوي تكون موازنة بين الضغط علي طبلة الأذن

الضغط المحتاج اليه العلاج وتبلغ نسبة زوياته من النصف على ثلاثة
اضعاف الضغط الجوي العادي للاوكسجين المنتفس ويذهب إلي الرئة ومن ثم
علي الدم ويتم تزويد الخلايا المتضررة والعنصر الاله لاعادة وبناء وتنشيط
وعملها

وتمثل كمية الاوكسجين في كريات الدم الحمراء 98% و2% يزوب في مصل
الدم وان هذا الكمية المذابة لا تستطيع رفعها الا عند رفع نسبة الضغط الجوي
المحاط بنا .

تمثل نسبة الضغط الجوي مقدار 2.4 بار مقارنة بالضغط الجوي العادي الذي
يبلغ نسبته 1 بار وبالتالي نرفع نسبة الاوكسجين المذابة في الدم الي 20
ضعف كما كانت عليه قبل رفع الضغط الجوي ويصل الدم المعبا بالاوكسجين
علي جميع خلايا الجسم وعن تحسنة حالة المريض ويتوقف علي نوع
المرضي او المرحلة قد تصل 40% من الحالات يستمر التحسن رغم انتهاء
العلاج لمدة طويلة .

العلاج بالاوكسجين تحت الضغط الجوي مبني علي اساس القوانين الفيزيائية
والبيولوجية .

لذلك تاثير العلاج بالاوكسجين عكس تاثير العلاج بالالوية

فوائد العلاج بالاوكسجين O2:-

- تسريع بناء وخلايا وانسجة جديدة للجسم
- بناء اوعية دموية شعيرية جديدة
- بناء العظمية التالفة والمتضررة
- حماية جدار الاوعية الدموية من ضرر ترسب كريات الدم علي
جدارها
- تقليل الاورام وازالتها بواسطة تقلص الاوعية الدموية

• لها فعل المضاد الحيوي فهو يقتل الميكروبات ويصنع فعالية سمومها وتحسين وتزويد المناطق الحساسة خاصة والجسم عامة بذلك الكمية المناسبة من الاوكسجين

• تنشيط الفعاليات الايضية التي كانت يبطئ العمل قبل العلاج

• يؤدي حفظ الافعال الحياتية المهمة باعاش فعاليات خلايا الجسم المهمة الشفاء

• الجروح المزمنة امر خطير السكري انسداد الشرايين

• تقرحات القدم المزمن 70 % من الحالات قد يحدث بتر الساق أو القدم هي سبب مضاعفات السكر المزمن وذلك بدأ العلاج بالاكسجين تحت الضغط الجوي بمقدار 2.4 بار في الوقت المناسب يؤدي الي شفاء هذا الجروح الخطيرة والاستئناء عن بتر الساق أو القدم

قبل بداية العلاج يقاس الضغط الجري للاوكسجين على حافة الجرح فاذا كان كمية الاوكسجين المقاس كافية فهذا عمل كبير في شفاء او الاقل تقليل نسبة البتر

علاج القدم السكرية بالاوزون

إن القدم السكرية علامة مميزة لاصابة الإنسان بمتاعب صحة في القدم والتي يبدأ على شكل التهاب بسيط وتدرجى مع مرور الوقت يتحول على قرحة أكثر تزداد عمقا واتساعا وتاكل انسجة القدم وتزداد شدة التهابات وقد يكون مصحوب بصديد ويتطور ويصبح غر غرينا وهنا تحدث مشكلة يتم العلاج من خلال رفع القدم المصابة بعد ترطيبها بالماء المقطر داخل كيس بلاستيكي محكم ثم يمرر غاز الاوزون الطبي علىه بتركيز خاص 21% الى حسب الحالة ولمدة حوالى 15-20 دقيقة على شكل جلسات يوميا فاذا تحسن الحالة يقل معدل الجلسات فى الوقت ذاته

يتم غسل القدم والقرح بماء الاوزون الطبي وكذلك بالدهانات وسمراهم الاوزون الذي يصنع من زيت الزيتون ويمرر غاز الاوزون لمدة حوالى 15/20 دقيقة خلال اسبوعين ومن ثم يتحول علي مراهم يحتوي علي

الأوزون وفي بعض الحالات الشديدة يمكن إعطاء الأوزون عن طريق الدم بتركيز يناسب مع المريض علي حسب نوع الجروح وحالة المريض والكمية المحتاج للعلاج .

تأثير غاز الأوزون :-

• لها تأثير رائع علاج مشاكل القدم السكري

• اذا ذهب المريض مبكرا خضع للعلاج بالأوزون سيستفاد بتر القدم

اهمية علاقة القدم السكري بعمليات بتر الاطراف :-

السكري هو السبب الرئيسي لعمليات البتر في الطرف السفلي في معظم انحاء العالم تمثل (60-70%) من كل حالات ونصف مرضي السكري الذين يخضعون للبتر لا يعيشون اكثر من ثلاثة سنوات بعد البتر حوالي ثلثين يكملون خمسة اعوام .

دواعي البتر :-

• ابهام القدم الارواح

• اصابع القدم المطرقية

• اصابع القدم العجاء

• مشط القدم الممدود

• القدم السقوف المزنب

يعتمد نجاح علاج القدم السكري علي كفاءة منهج العلاج متعدد التخصصات :

يجب ان تكون الهدف الرئيسي للعلاج وضع خطة فردية فعالية تشمل التشخيص المبكر ومنهج علاج الجروح واصابات الاوعية والعظام علي جانب توفير الاحذية المناسبة

الخراج والالتهابات المنتشرة والتقيح

- جروح الحلق والانسجة الرخوة
- النخر الرطب والجاف
- مضاعفات السكري علي الجهاز العصبي :-
- الجهاز العصبي المركزي (المخ - النخاع الشوكي) ويشمل :-
- الغيبوبة السكرية
- الشلل النصفي
- الجهاز الطرفي ويشمل :-
- الاعصاب الطرفية للحركة الارادية
- الاعصاب الطرفية لنقل الاحساس الي المخ
- الاعصاب الطرفية الباطنية الذاتية العمل
- كل اجزاء الجهاز العصبي تحدث فيها مضاعفات السكري
- مضاعفات الاعصاب الطرفية للاحساس ويشمل :
- سخونة في باطن القدمين
- الالام كوخز الابر في انحاء الجسم
- تنميل وخدر في الاطراف
- الالام مبرحة ليلا علي طول الساق
- الاصابات والجروح المتقيحة في القدمين
- الاعصاب الطرفية للحركة الارادية ويشمل :-
- شلل العصب السابع للوجه ويشل حركة الوجه

•

2

.

4

•

•

3

2

34

•

الباب الرابع

منطقة الدراسة

ومنهجية البحث

منطقة الدراسة ومنهجية البحث:

لقد تم الدراسة في مدينة عطبرة بمركز
نصر الدين عوض كرم الله - لأصدقاء
مرضى السكري
وكانت الدراسة تتضمن (٤٠) من العينات
في مختلف الأعمار وتم جمع البيانات عن
طريق الاستبيان الذي يحتوي على
(٢٥) سؤال بطريقة عشوائية

الباب الخامس
عرض النتائج
والجداول

الجدول:

• فحص القدمين يوميا ليحث عن الجروح والنفطات والتقرحات
وخطر الإصابة بالسكري النمط (1) في حالة وجود قريب مصاب

القريب المصاب بالسكري النمط (1)	خطر الإصابة
التونم المتماثل	35%
التونم غير المتماثل	20%
الاخ متماثل	16%
الاخ غير المتماثل	3%
الاب	9%
الام	3%
كلا الوالدين	حتى 30%

• خطر الإصابة بالسكري النمط (2) في حالة وجود اخ مصاب :

العمر عند حدوث السكري النمط	خطر السكري النمط (2) عند
(2) عند الاخ	باقية الاخوة
25-44	53%
45-54	37%
55-64	37%
65-80	31%

يبين الجدول التالي هذه الأنواع مع بداية تأثير كل منها وذروة تأثير ومدة هذا التأثير

نوع الانسولين	بداية التأثير	ذروة التأثير	مدي التأثير
الانسولين السريع (الانسولين lispro)	15-5 دقيقة	45-90 دقيقة	5-8 ساعة
الانسولين النظامي (R) (قصر)	30 دقيقة	2-5	5-8 ساعة

التأثير	1-3 ساعة	6-12 ساعة	16-24 ساعة
الانسولين متوسط التأثير NPH	1-3 ساعة	6-12 ساعة	16-24 ساعة
L) (N) lispro	4-6 ساعة	208 - ساعة	24-28 ساعة
الانسولين طويل التأثير (U)	30 دقيقة	7-12 ساعة	16-24 ساعة
مزيج NPH مع الانسولين النظامي			

جداول توضح نتائج تحليل الاستبيات :

جدول النسبة للجنسين

الفئة	التكرار	النسبة
الذكور	٢٥	% 61,5
الإناث	١٥	% 38,5

الفئة	التكرار	النسبة
من ١٥-١ سنة	-	-
من ١٦-٣٥ سنة	٣	% ٦,٥
من ٣٦-٥٥ سنة	١١	% ٢٦,٥
فوق ٥٥ سنة	٢٦	% ٦٧

الفئة	التكرار	النسبة
النوع الأول	٢٧	% ٦٨,٥
النوع الثاني	١٣	% ٣١,٥

جدول يوضح انواع العلاج

الفئة	التكرار	النسبة
أنسولين	٢٧	% ٦٨,٥

١٦	٤٠ %
٢٣	٥٦,٥ %

أنسولين مع حبوب
الحمية الغذائية

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يوجد لديهم تاريخ وراثي	٢٧	٦٧,٥ %
الذين لا يوجد لديهم تاريخ وراثي	١٣	٣١,٥ %

جدول يوضح التاريخ الوراثي

جدول يوضح نسبة المتابعة الدورية

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يهتمون بالمتابعة	٢٧	٩٢,٥ %
الذين لا يهتمون بالمتابعة	١٣	٧,٥ %

جدول يوضح نسبة الاهتمام بالنظافة

فترات المتابعة	التكرار	النسبة
يومية	٣٤	٩٠ %
عند الإصابة	٣	٧,٥ %
عند الجفاف	١	٢,٥ %

جدول يوضح نسبة الاهتمام بالغسيل

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يهتمون	٢٩	٧٢,٥ %
الذين لا يهتمون	١١	٢٧,٥ %

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يضعون البذرة	٦	١٥ %
الذين لا يضعون البذرة	٣٤	٨٥ %

جدول يوضح عدد الذين يضعون البذرة

جدول يوضح عدد الذين يستخدمون الدهان

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يضعون الدهان	١٩	% ٤٧,٥
الذين لا يضعون الدهان	٢١	% ٥٢,٥

جدول يوضح عدد الذين يفحصون على القدمين

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يفحصون	٣٢	% ٨٠
الذين لا يفحصون	٨	% ٢٠

جدول يوضح نسبة الفحص

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يساعدهم احد في الفحص	٢٤	% ٦٠
الذين لا يساعدهم احد في الفحص	١٦	% ٤٠

جدول يوضح نسبة قياس النبض

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يستطيعون	١٠	% ٢٥
الذين لا يستطيعون	٣٠	% ٧٥

جدول يوضح عدد الذين يرتدون الاحذية

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يرتدون	٢٧	% ٦٧,٥
الذين لا يرتدون	١٣	% ٣٢,٥

جدول يوضح عدد الذين يرتدون حذاء داخل المنزل والذين لا يرتدون

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يرتدون الحذاء	٣٠	% ٧٥
الذين لا يرتدون الحذاء	١٠	% ٢٥

جدول يوضح عدد الذين يرتدون جوارب

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يرتدون الجوارب	١٨	% ٤٥
الذين لا يرتدون الجوارب	٢٢	% ٥٥

جدول يوضح الذين يفحصون الحذاء قبل لبسه

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يفحصون الحذاء	٣١	% ٧٧.٥
الذين لا يفحصون الحذاء	٩	% ٢٢.٥

جدول يوضح الذين يشترون الأحذية

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يشترون الأحذية بأنفسهم	٣٠	% ٧٥
الذين لا يشترون الأحذية بأنفسهم	١٠	% ٢٥

جدول يوضح عدد الذين يقلمون أظافرهم بأنفسهم

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يقلمون أظافرهم بأنفسهم	٢٧	% ٦٧.٥
الذين يقلم لهم بالمساعدة	١٣	% ٣٢.٥

جدول يوضح عدد الذين يبردون اظافرهم بعد التقليم

الفئة	التكرار	النسبة
الذين يبردون	١٨	% ٤٥
الذين لا يبردون	٢٢	% ٥٥

جدول يوضح عدد الذين تلقوا وصايا وإرشادات بالمركز

الفئة	التكرار	النسبة
الذين تلقوا الوصايا والإرشادات	٢٣	% ٨٢.٥
الذين لا يتلقوا الوصايا والإرشادات	٧	% ١٧.٥

جدول يوضح عدد الذين تلقوا التثقيف بواسطة الملصقات والمحاضرات

الفئة	التكرار	النسبة
التثقيف بواسطة المحاضرات	٢٧	% ٦٧.٥
التثقيف بواسطة الملصقات	١١	% ٣٢.٥

جدول يوضح نسبة البتر

الفئة	التكرار	النسبة
الذين لديهم بتر	١٦	% ٤٠
الذين ليس لديهم بتر	٢٤	% ٦٠

الباب السادس
التوصيات
والمراجع
والمرفقات

التوصيات :

- يجب الى الدولة توفير المراكز الخاصة بالقدم السكرية مع التأهيل الكامل .
- تخفيف نفقات العلاج او العلاج المجاني
- تعميم المنحات الدراسية بالخارج بخصوص القدم السكرية .
- توفير الوسائل الحركية لي مبتري القدم السكرية (دراجات بخارية ... الخ)
- يجب اهتمام الوزارة بالمراكز الخاصة بالقدم السكرية
- نشر الوعي الصحي بخصوص مرض السكري ومضاعفاته
- تطبيق مجانية العلاج او تخفيضه بواسطة بطاقات التغطية الصحي
- يجب على المركز القيام بالتنسيق الصحي للمرضى بخصوص القدم السكرية
- افراض قسم خاص للعناية بالقدم السكرية بالمركز مع التأهيل الكامل
- على كل مريض الاهتمام والوعي الصحي بحالته ومرضه ومتابعة ما ينشر من وسائل الاعلام وفي الكتيبات ونشر الوعي اللازم في المدارس والمستشفيات
- الفحص الذاتي اليومي للقدم باعن سيفقد مريض السكري اجزاء جسمه وخاصة قدمية حتي يجنب نفسه من العصابات والتقرحات والجروح وعلاجها فوراً لتجنب المضاعفات الخطيرة
- يجب استخدام الاحذية المريحة ويفضل استخدام الجوارب القطنية والصوفية والبعد عن الضاغطة
- تجنب المشي حافي القدمين وعدم تعريض القدمين للماء البارد والماء الساخن
- الاهتمام بنظافة القدمين والاستعمال الماء الدافي والصابون وتجفيفه جيداً
- ولا تستعمل مواد كاوية او ضمادات ساخنة
- استخدم البدر او دهانات يوصفها لك طبيب لكي تساعد على ترطيب الجلد
- اطلب مساعدة في تقليم الاظافر ولا تستعمل الموس والمقص لازالة القشور وعين السمكة.

المراجع :

ياسين عرابي ، بسام البرشة ، جهاد خطاب . العلامات والتشخيص في الأمراض الجراحية . ط ١ - دمشق : دار القلم العربي ، ١٩٩٠ . ص ٧٤٧ - ص ٧٥٦ .

عماد زوكار . دليل مريض السكر من أجل حياة طبيعية . - [د.م.] : دار القلم للعلوم ، [٢٠١٩] . ص ١ - ص ٧٥ .

محمد زكي سويدان . التمريض والأمراض المعدية والباطنية . ط ٤ . - القاهرة : [د.ن.] ، ١٩٨٨ . ص ٥٩١ .

سيد احمد الخطيب . البسيط المفيد في علم السكري الجديد ط ١ . [د.م.] : [د.ن.] ، ٢٠٠٦ . ص ٣٢ - ص ٤٨ - ص ٥٢ .

حسن بن علي الزهداني . الإقدام السكرية الوقاية والعلاج . - [د.م.] : مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، ٢٠٠٦ . ص ١ - ص ١٦ - ص ٤٢ .

المرءات :

استبيان عن القدم السكرية

..... الاسم

النوع ذكر () انثى ()

العمر : من 1-15 سنة من 16-35 سنة من 36-55 سنة فوق 55 سنة

نوع السكر : النوع الاول () النوع الثاني ()

التاريخ الوراثي : يوجد () لا يوجد ()

نوع العلاج : انسولين () حبوب () حمية غذائية

الاعراض

برودة غير طبيعية في القدمين : نعم () لا () الم مبرح خلف المفاصل

نعم () لا ()

وجود زيادة في الاحساس بالالم : نعم () لا () الم مبرح في القدمين حتى

هل لديك امراض

اثناء الراحة : نعم () لا ()

وجروح ملتهبة غير معولمة : نعم () لا ()

المتابعة الدورية

كل شهر () كل ثلاث شهر () كل ستة شهر ()

هل تهتم بنظافة قدميك : نعم () لا ()

عند الجفاف ()

يوميا () عند الاصابة ()

هل بعد غسل قدميك بالماء والصابون تجفف خاصة بين الاصابع

() لا ()

هل تضع البودرة بعد التجفيف ؟ نعم () لا ()

هل تضع دهان خاص بوصفه الطبيب ؟ نعم () لا ()

- هل تفحص على قدميك وتتاكد من عدم وجود جروح واستعمال مراة
لفحص باطن القدم ؟ نعم () لا ()

- هل يساعدك احد في الفحص على قدميك ؟ نعم () لا ()

- هل تعلم كيفية قياس النبض بالقدمين ؟ نعم () لا ()

- نوع الحذاء الذي ترتديه مناسب ومريح للقدم من وواسع من الامام وبدون
سيور ؟ نعم () لا ()

- هل داخل المنزل تمشي بحذاء ؟ نعم () لا ()

- نوع الجوارب التي تستخدمها قطنية واسعة ونظيفة ؟ نعم () لا ()

- هل تفحص الحذاء دوريا وتتاكد من عدم وجود شيء غريب ؟ نعم () لا ()

- هل تشتري الاحذية بنفسك ؟ نعم () لا ()

- هل تقلم اظافرك بنفسك ؟ نعم () لا ()

- هل تقلم الاظافر من حافة الظفر ؟ نعم () لا ()

- هل تبرد الاظافر بعد تقليمها ؟ نعم () لا ()

- هل تلقي وصاية وارشادات بالمركز ؟ نعم () لا ()

- ما نوع التثقيف ؟

محاضرات () ملصقات () دورات ()

- هل يوجد بتر في القدم ؟ نعم () لا ()