

المبحث الأول

العناية بالحلمه

تبرز الحلمات أثناء فترة الحمل وتزداد مساحه الهاله التى حولها ويجب على المرأة ألا تكثر من إستخدام الصابون فى غسيل الحلمات أثناء الإستحمام طوال فترة الحمل لأن الصابون يعمل على إزابة وإزالة الزيوت الطبيعىه التى تفرز على الجلد مما يؤدى إلى الكحول أو الكولونيا كمطهرات للحلمه لأنه يتسبب فى تشقق الحلمه.

ومن الأفضل أن تقوم المرأة بتجفيف الثديين جيداً بعد الإنتهاء من الإستحمام ثم تقوم بتدليك الحلمه والهاله مستخدمه فى ذلك مرهم من اللانولين.

العناية بالثدى :

أن إختيار السوتيان المناسب لحجم الثدي أثناء الحمل له أثره فى راحة الثدي وعدم الضغط عليه أكثر من المطلوب وينصح العديد من الأطباء المرأة الحامل أن تبدأ فى عمل مساج (تدليك) للثديين مع بداية الأسبوع الثلاثين للحمل.

وتتم عملية التدليك بأن تضع المرأة الحامل يداها مفتوحتان على محيط كل الثدي. وتبدأ فى تحريكهما نحو الهاله مع الضغط بلطف على الثدي فإن ذلك يساعد على فتح الأنابيب داخل الثديين ويجعلهما جاهزين لجريان اللبن بعد الولاده .

المبحث الثانى

تشجيع الأم على الرضاعة الطبيعية

عندما نسأل بعض الأمهات لماذا يرفض الرضاعة الطبيعية أو يقمن باستخدام الأغذية التكميلية مبكراً لأجابه (البنى لم يكن كافياً) أو (طفلى يرفض الرضاعة) والواقع أن اللبن غير كافى وأن الطفل لا يرفض الرضاعة وإنما هناك أسباب أخرى يمكن أن تتلخص فى الآتى:

1-إنعدام تشجيع القريبات:

مثل الأم أو الأخت فلو قامو بتشجيع الأم الحديثه لإستطاعت التغلب على متاعب الرضاعة.

2-الرشاقه وجمال الثدي:

تتجه بعض الأمهات إلى إستخدام الأغذية الصناعيه رغبة منهن فى المحافظه على رشاقتهن والإبقاء على اندائهن بدون ترهل.

3-عدم ثقة الأم بنفسها:

لكى تتم عملية الرضاعة الطبيعیه لابد أن تكون الأم على ثقه كامله بنفسها وعليها أن تؤمن أن بمقدورها إرضاع طفلها وإن لبن الثدي هو كل ما يحتاجه طفلها لى ينمو بصحه جيده .

يلاحظ فى الأسابيع الأولى التى تلى الولاده مباشرة تعتبر مرحله إنتقاليه فى حياة الأم تكون فيها الأم عادة سريعه الإنزعاج متقلبه المزاج شديدة القلق لأبسط الأمور ، لذلك وجب تشجيعها وبث الثقه فى نفسها.

4-الموقف السلبي للزوج:

للزوج دور هام فى هذه المرحله فعلى الزوج أن يصر على ان تقوم زوجته بإرضاع طفلها من ثديها وأن تتحمل المتاعب البسيطه التى قد تقابل أى أم فى الأيام الأولى وذلك حتى تتجح فى عملية الإرضاع الطبيعى وتستمر فيها.

المبحث الثالث

كيفية الرضاعة السليمة

لكى نقرر ما إذا كان الطفل يرضع فى الوضع السليم أم الوضع الخاطئ يجب

مراعاة النقاط التالية:

- 1- عدم إرضاع الطفل فى الأيام الأولى من زجاجة تحت أى ظرف من الظروف وذلك لأن الحلمة المطاطية طويلة ولا تتطلب منه أى مجهود لأنه يشدها ، فإذا تحول بعدها إلى الرضاعة الطبيعية نجده يمص حلمة الثدي بلا مجهود لأنه يتعلم أن يشد الحلمة التى تبرز فى فمه ، هذا المص الخاطئ يسبب إلتهاب الحلمات وأيضاً يسبب قلق الطفل وعصبية لأنه لا يحصل على اللبن من ثدى أمه بنفس السهولة التى كان يحصل عليها من الزجاجات ذات الحلمة المطاطية.
- 2- يجب أن تكون الأم جالسة فى مكان مريح ومسترخيه تماماً لأن إسترخاء الأم أثناء عملية الرضاعة يعطى الطفل الإحساس بالراحة والأمان كذلك يجب أن تقوم باسناد رأس الطفل بوساده صغيره حتى تتأكد أن جسمه فى مواجهة الثدي وليس رأسه فقط.
- 3- ينبغى أن تضم الأم طفلها بزراعيها من مؤخرة كتفيه وليس من مؤخرة رأسه .
- 4- يجب أن تمسك الأم ثديها كله وليس الحلمة فقط وتقدمه للرضيع وعليها ملامسة وجنة الطفل بحلمة ثديها وسوف يدير الطفل وجهه بالغريزة نحو الثدي ويجب أن يكون الطفل قادراً على التنفس من أنفه أثناء قيامه بمص اللبن من ثدى الأم.

المبحث الرابع

تنظيم الرضعات ومدتها

الرضعه الأولى :

يجب أن تبدأ أول رضعه على سرير الولاده وينبغي أن تغطي الأم والمولود جيداً لتدفئتهما وأن تضم الأم المولود إلى صدرها للرضاعه حتى إذا كان ثديها خالى من اللبن.

ويجب أن تعلم كل أم أن الساعه الأولى لما بعد الولاده أهم فتره لإرساء علاقة الارتباط بين الأم والطفل وهذا ينجح الرضاعه الطبيعیه وإستمرارها .

المشاركه فى الغرفه :

ينبغي على الأم أن تضع طفلها فى نفس الفراش أو فى مهد صغير ملاصق لفراشها ولتعلم الأم أن مشاركة الطفل فى الغرفه يقوى إستجابتها للطفل منذ اللحظة الأولى .
وليس هناك أى خطر من نوم الطفل مع أمه فى فراش واحد مالم تكن مريضه جداً أو فى حالة غيبوبه .

الرضاعه عند الطلب فى الأيام الأولى :

يجب أن تترك الأم حرية حمل طفلها وإرضاعه كلما بكى أو كلما أحست هى برغبه فى إرضاعه وتسمى هذه العمليه (الرضاعه عند الطلب) والطفل فى أيامه الأولى يرضع بشكل منتظم ولكن بعد إسبوع أو إسبوعين تبدأ الرضاعه تأخذ شكلاً منتظماً وهذا يختلف من طفل لآخر.

مدة الرضاعة :

بعض الأمهات يعتقدن أن طول مدة الرضعة قد يتسبب في إلتهاب الحلمات ولكن أثبتت الدراسات أن مدة الرضعة لا دخل لها إطلاقاً بإلتهاب حلمات الثدي الذى ينشأ أساساً نتيجة للوضع الخاطئ للحلمه فى فم الرضيع . معظم الأطفال يستغرقون من 5- 10 دقائق فى الرضعة الواحده والبعض يستغرق وقتاً أطول تصل أحياناً لنصف ساعه للرضعة الواحده . وقد أثبتت الدراسات أن الطفل بطئ الرضاعة يحصل على نفس كمية اللبن التى يحصل عليها الطفل سريع الرضاعة.

فإذا منعنا الطفل بطئ الرضاعة من الثدي قبل أن يتركه تلقائياً بذلك لا تمكنه من الحصول على كفايته من اللبن (خاصه الذى يفرزه ثدى الأم فى نهاية الرضعة يكون غنياً بالطاقة التى يحتاجها الطفل للنمو السليم) لذلك يجب على الأم عدم التقيد بمده معينه للرضعه.

الإرضاع من كلى الثديين :

قد يحتاج الطفل إلى الرضاعة من الثديين فى كل رضعه ولا يكتفى بثدى واحد خاصة إذا كان طفلاً كبير الحجم أما الأطفال الأقل وزناً يكتفون بثدى واحد ، وكثير من الأطفال يفضلون الرضاعة من ثدى واحد ، وكثير من الأطفال يفضلون الرضاعة من ثدى معين وأكثر من الثانى وذلك على توقف إنتاج اللبن فى الثدي المهمل يجب على الأم البدء بأحد الثديين فى الرضعة الأولى وبالتدى الآخر فى الرضعة الثانیه وبذلك يتعرض الثديان لمقدار متساوي من المص وبالتالي يستمران فى إنتاج اللبن ويحتفظان بحجم متساوي.

الرضاعة الليلية :

قد تحاول بعض الأمهات حمل أطفالهن على النوم طوال الليل دون إرضاعهم وذلك حتى ينلن قسطاً من الراحة ومن الأفضل أن ترضع طفلها أثناء الليل كلما أراد لأن الرضعات

تساعد على إستقرار معدل إفراز اللبن كما أنها مفيدة بشكل خاص للأم العامله والتي تضطر أن تترك طفلها حوالى 8 ساعات بدون رضاعه طبيعيه أثناء النهار.

المبحث الخامس

المشكلات المبكرة فى الرضاعة الطبيعية

قد تتعرض الأم التى تلد لأول مره ،لبعض الصعوبات فى عملية الرضاعة الطبيعية، لكن هذا ليس معناه الفشل أو الإستسلام والتحول إلى الرضاعة الصناعيه ، ومن أهم الصعوبات التى قد تواجه الأم ما يلى :-

1-إمتلاء الثديان بشده وإحساس الأم بالألم :

حين يبدأ الثديان فى إفراز اللبن فإن الأم تشعر بإمتلاء شديد فيهما وعادة يتورمان ويصبح ملمسهما صلباً . ولأن هذا الوضع بالنسبه للأم يعتبر غير مألوف فهى تشعر بالألم والقلق معاً . وكل هذه الامور طبيعیه للغايه تتعرض لها كل أم حديثه الأمومه . يجب تشجيع الأم على تحمل الألم والقيام بإرضاع طفلها حتى تقل كمية اللبن وبالتالي تقل صلابه الثدي وتضخمه فتشعر الأم بشئ من الراحة ، وإذا لم يرضع الطفل القدر الكافى (الذى يريح الأم) من الثديين الممتلئين باللبن فعلى الأم أن تستعمل الشفاطه فى سحب اللبن (لأن العصر باليد سوف يؤلمها فى هذه الحاله) حتى تخفف من شدة إمتلاءهما .

والواقع أن إستخدام الشفاطه له مميزات منها :

- أ- الأم تضطر إلى لمس منطقة الحلمه التى تكون مؤلمه نظراً لشدة الثدي باللبن .
- ب- إستعمال الشفاطه يساعد على ليونة الثدي حيث تسحب كميات من اللبن المتكدس به.
- ج- يساعد إستعمال الشفاطه على إبراز حلمه الثدي التى غالباً ما تكون مسطحه فى حالة شدة إمتلاء الثدي باللبن .

د- يمكن للأم تقديم اللبن المسحوب بالشفاطه إلى طفلها عن طريق ملعقة بلاستيك نظيفه.

ه- بعد ليونة الثدي و بروز الحلمه قليلاً يمكن للأم إعطاء ثديها للطفل مباشرة ليقوم بالرضاعه وإمتصاص ما يحتاجه من لبن الأم وتبدأ عملية الرضاعه .

2- التهاب الحلمات :

يعتبر مص الطفل للحلمه فى وضع غير سليم هو أكثر اسباب التهاب الحلمات شيوعاً . لأن الطفل إذا لم يدخل جزءاً كافياً من هالة الثدي فإنه يمص رأس الحلمه فقط وذلك يسبب التهاب الحلمات الموضعى ويمكن للأم تجنب التهاب الحلمات إذا إتبعت النقاط التاليه :

مساعدة الطفل على التمكن جيداً من الحلمه فى الوضع السليم حتى لو كان الأم ر يؤلمها بعض الشئ وهنا يجب أن تعلم الأم أنها إذا شعرت ببعض الألم حين يتناول الطفل ثديها فهذا دليل من إن وضع الحلمه بالفم سليم .

يجب عدم غسل حلمات الثدي بالصابون .

على الأم أن تشد حلمة الثدي من فم الطفل بعد الرضاعه ولكن تنتظر حتى يتركها من تلقاء نفسه . وإذا حدث أمر يستدعى أن ترفع الأم الطفل عن ثديها فعليها أن تدخل طرف إصبعها فى فمه حتى يترك الحلمه .

3- تشقق الحلمات :

إذا إستمر الطفل يمص الحلمه بطريقه خاطئه فسوف تظهر فيها تشققات ، مما يؤدى إلي إزدياد الفرصه لدخول البكتيريا إلى أنسجة الثدي ويسبب إلتهاباً مرضياً أو خراجاً بالثدى ، ويزداد الأمر سوءاً إذا توقف الطفل عن الرضاعه وبقي اللبن فى الثدي . ولكى تتغلب الأم على مشكلة تشقق حلمات الثدي يجب عليها إتباع ما يلى :

- التأكد من تصحيح وضع الرضاعه .

- تعريض حلمات الثدي للهواء والشمس لأطول فترة ممكنة بين الرضعات .
- ترك قطره من اللبن على الحلمة بعد إنتهاء الطفل من الرضعة ، فذلك يساعد على ليونتها وسرعة إلتئامها .

إذا لم تتحمل الأم إرضاع طفلها فى حالة تشقق الحلمات فعليها سحب اللبن بالشفاطه وعدم تركه يتزايد فى ثديها حتى لا يزداد الأمر سوءا وإذا لم تتحمل الشفاطه ... يمكنها الضغط برفق على الثدي بقطنه مبلله بالماء الساخن حتى يبدأ الثدي فى إفراز اللبن وتقدمه بعد ذلك للطفل بالفنجان والملعقه.

4- الحلمات القصيره :

تعتقد بعض الأمهات أن حلمات ثديهن أقصر مما يمكنهن من الإرضاع . والواقع أن طول أو قصر الحلمة لا يهمل بقدر ما يهمل قابلية الحلمة للمص (البروز) .

5- رشح اللبن :

يسيل اللبن من ثدى الأم المرضع خلال الأسابيع الأولى من الرضاعة وهذه المشكله تسبب حرجا وإزعاجاً للأم خاصة الأم العامله (الموظفه) .

وتتوقف هذه الظاهره تلقائيا عندما يلين الثديين بعض الشئ مقارنة بالأيام الأولى للرضاعه. ويمكن للأم أن تضع قطعاً نظيفة من الشاش داخل ثيابها لتمتص اللبن ، وتقوم بتغييرها من أن لآخر ، على أن تتخلص منها كلما تشبعت باللبن أو أن تقوم بغسلها جيدا إذا كانت تنوى إستخدامها مره ثانيه . أيضا يمكن للأم التخلص من اللبن الزائد وذلك بعصره فى برطمان نظيف من الزجاج محكم الغطاء على أن تقدمه للطفل بعد عودتها من العمل .

6- خراج الثدي :

فى مراحل تكوينه الأولى يمكن أن يسمى (تجمع لبنى) وهو عبارته عن كتله شبه متحجرة تظهر بالثدى نتيجة لإنسداد إحدى قنوات إفراز اللبن وحدوث بعض الإحتقانات بالثدى.

وخارج الثدى مؤلم للغاية وعلى الأم إذا تعرضت لهذه الحالة أن تتبع ما يأتى :

أ- عليها أن تستمر فى الإرضاع الطبيعى بالرغم من الألم .

ب- إذا كان الألم غير محتمل فعليها التخلص من اللبن الموجود بالثدى المصاب سواء بالشفاطه أو بالعصر باليد ، أيهما أفضل لها وتكرر عملية التخلص من اللبن عدة مرات يومياً.

ج - تناول مضاد حيوى مناسب تحت إشراف الطبيب .

د- القيام بعمل كمادات ماء دافئ على الثدى عدة مرات يومياً لتخفيف الألم .

هـ - تناول بعض أقراص الإسبرين للحد من الألم وتجنب إرتفاع درجة الحرارة .

إذا فشلت هذه المحاولات (لا قدر الله) فى إنهاء وجود التجمع اللبنى وتطور الأمر فاصبح خراجا بالثدى أدى إلى رفع درجة حرارة جسم الأم فلا بد فى هذه الحالة من نقل الأم إلى المستشفى على الفور وعمل اللازم . ويجب متابعة الرضاعه بمجرد عودة الأم من المستشفى ولتبدأ بالثدى السليم أولاً وبعدها بالثدى الذى كانت به الإصابه .

7 - الحلمات المقلوبه :

هناك حاله واحده من بين كل خمس نساء تعانى من عدم بروز الحلمه بالقدر الكافى الذى

يمكنها من الإرضاع بسهولة ، بل تكون مختفيه فى عضلات الثدى . هذه حاله تسمى (

الحلمات المقلوبه) .

موانع الإرضاع الطبيعى :