


الباب الخامس

النتائج والتوصيات

عرض النتائج:

١. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للفئات العمرية التي تم استبيانها حول أسباب وعلاج الإدمان باستخدام الأدوية المخدرة والمسكنة:

الفئة العمرية	التكرارات	النسبة المئوية
٢٥ - ١٥	٢٦	٢٦%
٣٥ - ٢٥	٣٧	٣٧%
٤٥ - ٣٥	٢٧	٢٧%
٦٥ - ٤٥	١٠	١٠%
المجموع	١٠٠	١٠٠%




شكل (١) يوضح النسبة المئوية للفئات العمرية التي تم استبيانها حول أسباب وعلاج الإدمان باستخدام الأدوية المخدرة والمسكنة.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة الفئة العمرية ١٥ - ٢٥ تمثل ٢٦% ونسبة الفئة العمرية ٢٥ - ٣٥ تمثل ٣٧% ونسبة الفئة العمرية ٣٥ - ٤٥ تمثل ٢٧% ونسبة الفئة العمرية ٤٥ - ٦٥ تمثل ١٠%.

٢. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للنوع:

النوع	التكرارات	النسبة المئوية
ذكر	٦٠	%٦٠
أنثى	٤٠	%٤٠
المجموع	١٠٠	%١٠٠



شكل (٢) يوضح النسبة المئوية للنوع.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة الذكور تمثل ٦٠% ونسبة الإناث تمثل ٤٠%.

٣. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للمستوي التعليمي:

المرحلة	عدد الأشخاص	النسبة المئوية
ثانوي	٧	%٧
جامعي	٨٣	%٨٣
فوق الجامعي	١٠	%١٠
المجموع	١٠٠	%١٠٠




شكل (٣) يوضح النسبة المئوية للمستوي التعليمي.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة الثانويين تمثل ٧% ونسبة الجامعيين تمثل ٨٣% ونسبة الدارسين فوق الجامعي تمثل ١٠%.

٤. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للأشخاص المتزوجين وغير المتزوجين:

النسبة المئوية	عدد الأشخاص	الحالة
٥٧%	٥٧	المتزوجين
٤٣%	٤٣	غير المتزوجين
١٠٠%	١٠٠	المجموع




شكل (٤) يوضح النسبة المئوية للأشخاص المتزوجين وغير المتزوجين.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة الأشخاص المتزوجين تمثل ٥٧% ونسبة غير المتزوجين تمثل ٤٣%.

٥. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للمهنة:

المهنة	عدد الأشخاص	النسبة المئوية
طبيب	٣٦	%٣٦
صيدلي	٤٥	%٤٥
ممرض	١١	%١١
مساعد طبي	٨	%٨
أخرى	٠	%٠
المجموع	١٠٠	%١٠٠




شكل (٥) يوضح النسبة المئوية للمهنة

من عينة الدراسة وجد أن نسبة الأطباء تمثل ٣٦% ونسبة الصيادلة تمثل ٤٥% ونسبة الممرضين تمثل ١١% ونسبة المساعدين الطبيين تمثل ٨% ونسبة المهن الأخرى تمثل ٠%.

٦. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للأشخاص الذين قاموا بصرف أدوية مخدرة من قبل:

الحالة	التكرارات	النسبة المئوية
نعم	٩٥	%٩٥
لا	٥	%٥
المجموع	١٠٠	%١٠٠




شكل (٦) يوضح النسبة المئوية للأشخاص الذين قاموا بصرف أدوية مخدرة من قبل.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة الأشخاص الذين قاموا بصرف أدوية مخدرة من قبل تمثل ٩٥% ونسبة الذين لم يقوموا بصرف أدوية مخدرة من قبل تمثل ٥%.

٧. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للأدوية المخدرة التي تم صرفها من قبل الأشخاص الذين تم استبيانهم:

الدواء	التكرارات	النسبة المئوية
بندين	٤	%٤
مورفين	٠	%٠
ترامادول	٠	%٠
بندين ومورفين	٥	%٥
بندين وترامادول	١٠	%١٠
ترامادول ومورفين	١١	%١١
بندين وترامادول ومورفين	٧٠	%٧٠
المجموع	١٠٠	%١٠٠




شكل (٧) يوضح النسبة المئوية للأدوية المخدرة التي تم صرفها من قبل الأشخاص الذين تم استبيانهم.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة البندين فقط تمثل ٤% ونسبة المورفين فقط تمثل ٠% ونسبة الترامادول فقط تمثل ٠% ونسبة البندين والمورفين تمثل ٥% ونسبة البندين والترامادول تمثل ١٠% ونسبة الترامادول والمورفين تمثل ١١% ونسبة البندين والمورفين والترامادول تمثل ٧٠%.

٨. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للحالات التي تستخدم فيها هذه الأدوية:

الحالة	التكرارات	النسبة المئوية
ما بعد العمليات الجراحية	٣٦	%٣٦
الآلام الحادة	٥٢	%٥٢
الكسور	٨	%٨
التشنجات	٤	%٤
المجموع	١٠٠	%١٠٠




شكل (٨) يوضح النسبة المئوية للحالات التي تستخدم فيها هذه الأدوية.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة ما بعد العمليات الجراحية تمثل ٣٦% ونسبة الآلام الحادة تمثل ٥٢% ونسبة الكسور تمثل ٨% ونسبة التشنجات تمثل ٤%.

٩. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للإجراءات المتبعة لصرف هذه الأدوية:

الإجراء	التكرارات	النسبة المئوية
فورمات المخدرات	١٠٠	%١٠٠
استلام الفارغ	١٠٠	%١٠٠
إمضاء الطبيب وإبراز بطاقته	١٠٠	%١٠٠
المجموع	١٠٠	%١٠٠




شكل (٩) يوضح النسبة المئوية للإجراءات المتبعة لصرف هذه الأدوية.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة فورمات المخدرات تمثل ١٠٠% ونسبة استلام الفارغ تمثل ١٠٠% ونسبة إمضاء الطبيب وإبراز بطاقته تمثل ١٠٠%.

١٠. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للأماكن المسموح لها بصرف هذه الأدوية:

الاماكن	التكرارات	النسبة المئوية
الصيدليات الخاصة	٠	%٠
صيدليات المستشفيات	١٠٠	%١٠٠
صيدليات المراكز الصحية	٠	%٠
مخازن الأدوية	٠	%٠
شركات الأدوية	٠	%٠
المجموع	١٠٠	%١٠٠




شكل (١٠) يوضح النسبة المئوية للأماكن المسموح لها بصرف هذه الأدوية.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة الصيدليات الخاصة تمثل %٠ ونسبة صيدليات المستشفيات تمثل %١٠٠ ونسبة صيدليات المراكز الصحية تمثل %٠ ونسبة مخازن الأدوية تمثل %٠ ونسبة شركات الأدوية تمثل %٠.

١١. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية لكيفية حفظ هذه الأدوية في مؤسسات الأشخاص الذين تم استبيانهم:

كيفية الحفظ	التكرارات	النسبة المئوية
في رفوف الصيدلية	٠	%٠
في دولا ب مفتوح	٠	%٠
في دولا ب خاص مغلق	١٠٠	%١٠٠
المجموع	١٠٠	%١٠٠




شكل (١١) يوضح النسبة المئوية لكيفية حفظ هذه الأدوية في مؤسسات الأشخاص الذين تم استبيانهم.

من عينة الدراسة وجد أن كيفية حفظ هذه الأدوية في رفوف الصيدلية تمثل %٠ ونسبة حفظها في دولا ب مفتوح تمثل %٠ ونسبة حفظها في دولا ب خاص مغلق تمثل %١٠٠.

١٢. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية لوجود إساءة في استخدام هذا النوع من الأدوية:

وجود إساءة في الاستخدام	التكرارات	النسبة المئوية
نعم	١٠	%١٠
لا	٩٠	%٩٠
المجموع	١٠٠	%١٠٠




شكل (١٢) يوضح النسبة المئوية لوجود إساءة في استخدام هذا النوع من الأدوية.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة وجود إساءة تمثل ١٠% ونسبة عدم وجود إساءة تمثل ٩٠%.

١٣. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للفئات التي تسيء استخدام هذا النوع من الأدوية:

الفئة	التكرارات	النسبة المئوية
الأطباء والصيادلة	١	١%
المرضى والصيادلة	٣	٣%
الصيادلة والأطباء والمرضى	٤	٤%
المساعدات الطبيين والمرضى	٢	٢%
عدم وجود فئات معينة	٩٠	٩٠%
المجموع	١٠٠	١٠٠%




شكل (١٣) يوضح النسبة المئوية للفئات التي تسيء استخدام هذا النوع من الأدوية.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة الأطباء والصيادلة تمثل ١% ونسبة المرضى والصيادلة تمثل ٣% ونسبة الصيادلة والأطباء والمرضى تمثل ٤% ونسبة المساعدات الطبيين والمرضى تمثل ٢% ونسبة عدم وجود فئات معينة تمثل ٩٠%.

١٤. جدول تكراري يوضح النسبة المئوية للأسباب التي تدفع هذه الفئات إلى إساءة استخدام هذا النوع من الأدوية:

السبب	التكرارات	النسبة المئوية
ضغط العمل	١	١%
الظروف الخارجية المحيطة	١	١%
ظروف أسرية	٣	٣%
توفره لدى هذه الفئات	٥	٥%
لا أسباب	٩٠	٩٠%
المجموع	١٠٠	١٠٠%



شكل (١٤) يوضح النسبة المئوية للأسباب التي تدفع هذه الفئات إلى إساءة استخدام هذا النوع من الأدوية.

من عينة الدراسة وجد أن نسبة ضغط العمل تمثل ١% ونسبة الظروف الخارجية المحيطة تمثل ١% ونسبة الظروف الأسرية تمثل ٣% ونسبة توفره لدى هذه الفئات تمثل ٥% ونسبة لا أسباب تمثل ٩٠%.