


جدول رقم ١٥ : يوضح مدى علم المستخدم بالآثار الجانبية للمسكنات والفيتامينات

معرفة الآثار الجانبية للمسكنات والفيتامينات	التكرار	النسبة المئوية
نعم	٣٣	%٣٣
لا	٦٧	%٦٧

وجد ان نسبة المرضى اللذين يعلمون بالآثار الجانبية للأدوية المسكنة والفيتامينات ٦٧% واللذين لايعلمون بالآثار الجانبية كانت نسبتهم ٣٣% .

رسم بياني يوضح مدى معرفة المرضى بالآثار
الجانبية للأدوية المسكنة والفيتامينات




- المرضى اللذين يعلمون بالآثار الجانبية للمسكنات والفيتامينات
- المرضى اللذين لايعلمون بالآثار الجانبية للمسكنات والفيتامينات

جدول رقم ١٦ : يوضح اطمئنان المستخدم للأدوية المسكنة والفيتامينات

الاطمئنان للاستخدام	التكرار	النسبة المئوية
نعم	٦٤	%٦٤
لا	٣٦	%٣٦

وجد أن نسبة اللذين يستخدمون الأدوية المسكنة والفيتامينات باطمئنان %٦٤ و نسبة اللذين يستخدمونها من غير اطمئنان %٣٦ .


رسم بياني يوضح مدى اطمئنان المرضى لآخذ
الأدوية المسكنة والفيتامينات



جدول رقم ١٧ : يوضح تفضيل أخذ المسكنات للأطفال

اعطاء الأدوية المسكنة للأطفال	التكرار	النسبة المئوية
نعم	٦٤	%٦٤
لا	٣٦	%٣٦


وجد أن نسبة المؤيدين إعطاء الاطفال الأدوية المسكنة ٦٤% والذين لا يؤيدون إعطاء الأدوية المسكنة للأطفال ٣٦% .



جدول رقم ١٩ : يوضح استخدام النساء الحوامل للأدوية المسكنة

استخدام الحوامل للأدوية المسكنة	التكرار	النسبة المئوية
نعم	١٢	26%
لا	٣٤	74%

وجد ان نسبة النساء الحوامل المستخدمات للمسكنات ٢٦% والنساء اللاتي لا يستخدمنها ٧٤% .




جدول رقم ٢٠ : يوضح استخدام النساء للفيتامينات اثناء فترة الحمل

استخدام الفيتامينات للحوامل	التكرار	النسبة المئوية
نعم	٣٥	%٧٦
لا	١١	%٢٤

وجد أن نسبة النساء الحوامل المستخدمات للفيتامينات عالية حيث بلغت %٧٦ واللاتي لا يستخدمونها نسبتهم اقل وهي %٢٤ .

رسم بياني يوضح استخدام النساء الحوامل
والمرضعات للفيتامينات اثناء فترة الحمل والرضاعة



- النساء الحوامل والمرضعات المستخدمات للفيتامينات
- النساء الحوامل والمرضعات الغير مستخدمات للفيتامينات اثناء فترة الحمل


جدول رقم ٢١ : يوضح مدى استخدام الأدوية المسكنة والفيتامينات بعد استشارة الطبيب

الاستخدام	التكرار	النسبة المئوية
نعم	70	70 %
لا	30	30 %

وجد أن نسبة اللذين يستخدمون الأدوية المسكنة والفيتامينات بعد استشارة الطبيب ٧٠% ونسبة اللذين يستخدمونها دون استشارة الطبيب ٣٠% .

رسم بياني يوضح المستخدمين للأدوية المسكنة

والفيتامينات بعد استشارة الطبيب




- اللذين يستخدمون الادوية المسكنة والفيتامينات بعد استشارة الطبيب
- اللذين يستخدمون الادوية المسكنة والفيتامينات بعد استشارة لا طبيب

جدول رقم ٢٢ : يوضح مدى الالتزام بارشادات الطبيب في استخدام الأدوية المسكنة والفيتامينات:

الالتزام بالارشادات	التكرار	النسبة المئوية
نعم	85	85 %
لا	15	15 %

وجد أن نسبة الذين يلتزمون باتباع ارشادات الطبيب في استخدام المسكنات والفيتامينات ٨٥% ونسبة الذين لا يتبعون ارشادات الطبيب ١٥% .




جدول رقم ٢٣ : يوضح التفضيل في شراء الأدوية المسكنة والفيتامينات في الاسعار:

التكرار	النسبة المئوية	التفضيل في الاسعار
33	33 %	الأدوية ذات الاسعار المنخفضة
67	67 %	الأدوية ذات الاسعار العالية المرفوعة

وجد أن نسبة المفضلين للأدوية الغالية اعلي من المفضلين الأدوية ذات الاسعار المنخفضة حيث وجد ان نسبة المفضلين للأدوية ذات الاسعار الغالية ٦٧% ونسبة المفضلين للأدوية ذات الاسعار المنخفضة ٣٣% .

رسم بياني يوضح تفضيل اسعار الادوية




- اللذين يفضلون الادوية ذات الاسعار الغالية
- المفضلين للادوية المنخفضة الاسعار

جدول رقم ٢٤ : يوضح نسبة الحالات التي تعرضت لآثار جانبية نتيجة أخذ أدوية مسكنة:

النسبة المئوية	التكرار	التعرض للآثار
26 %	26	نعم
74 %	74	لا

وجد أن نسبة الغير متعرضين لآثار جانبية من الأدوية المسكنة اعلي نسبة حيث بلغت ٧٤% ونسبة اللذين لم يتعرضوا لآثار جانبية من الأدوية ٢٦% .




جدول رقم ٢٥ : يوضح نسبة الحالات التي تعرضت لآثار جانبية نتيجة أخذ أدوية الفيتامينات

النسبة المئوية	التكرار	التعرض للآثار
٩%	٩	نعم
٩١%	٩١	لا

وجد أن نسبة المصابين لآثار جانبية من استخدام الفيتامينات ٩% واللذين لم يتعرضوا لآثار جانبية بنسبة ٩١% .

رسم بياني يوضح التعرض لآثار جانبية من استخدام الفيتامينات



■ المصابين بآثار

■ الغير مصابين بآثار

الفصل السادس

تحليل نتائج الاستبيان والتوصيات

الفصل الرابع

تحليل نتائج الاستبيان والتوصيات

تحليل الاستبيان

وجد ان نسبة المستخدمين للأدوية المسكنة ٨٤% وذلك لتقليل وازالة الالم ونسبة ١٦% لا يستخدمونها وذلك لخوفهم من الأعراض الجانبية لها

وجد أن نسبة المستخدمين للأدوية المسكنة من الذكور منهم ٤٠,٥% ووجد ان نسبة الاناث منها ٥٩,٥% وذلك لاستخدام الاناث للأدوية المسكنة أكثر من الرجال علي سبيل المثال ما يعرف بالمادة الشهرية حيث يصحبها ارتفاع في البروستوغلادين مما يؤدي إلى الم شديد ومن ناحية أخرى حيث أن المرضي من النساء تميل إلى العلاج ذو الفترات القصيرة .

وجد ان نسبة من يقومون بشراء الأدوية المسكنة من الصيدليات ٨٩,٣% نسبة لاطمئنان المرضي من أخذها من الصيدلية وكانت نسبة من يقومون بشرائها من مخازن الأدوية ٢,٢% وذلك نسبة لعدم توفر المخازن وقلتها ونسبه من يقومون بشرائها من أماكن أخرى كانت ٨,٣٣% حيث اتفق جميعهم علي شرائها من البقالات والمحال التجارية الأخرى وذلك لتوفر الأدوية بها بسعر مناسب.

وجد ان نسبة الكيدين يستخدمون المسكنات ٧٨,٦% لاغراض علاجية وذلك نسبة لان المسكنات تساعد في ازالة الكثير من الآلام والتخفيف علي المرضي ووجد ان نسبة من يستخدمونها لدواعي وقائية ١٣,٣% لان معظم المسكنات تقي من الجلطات وتقي أيضاً من سرطان الثدي عند النساء المرضعات مثل الاسبرين ونسبة من يستخدمونها لأسباب ودواعي نفسه ٨,٣% وذلك نسبة لان الشيوخ وكبار السن وبعض الشباب يتوهمون المرض.

وجد أن أعلي نسبة هي الاستخدام للبندول نسبة لتوفره في جميع أماكن سابقة الذكر وهو المعروف بالنسبة لجميع المرضي وأسعاره في متناول أيدي الجميع.

التوصيات

- عدم استخدام الفايتمينات والمسكنات بدون وصفه طبية .
- الالتزام باتباع التعليمات المتعلقة باستخدام الدواء الصادرة من الطبيب أو الصيدلي.
- الاهتمام بالاعلام والتثقيف الدوائي ونشر ثقافة الاستخدام الصحيح للدواء وتوعية المواطنين بالآثار الجانبية لها.
- مراجعة الطبيب المختص عند ظهور أي أثر جانبي نتيجة لاستخدام الدواء.
- تشديد الرقابه علي اماكن بيع الدواء للوصول إلى الاستخدام الرشيد للدواء.

المراجع :

١. التغذية والصحة (التغذية البديلة) ، د. عبد المجيد الشاعر . رشدي قطاش .
٢. صحة الإنسان وسلامة الغذاء ، د. أيمن مزاهرة ، أنس بلييل .
٣. علم الدواء ، محمد أحمد دنش .
4. Basic and Clinical Pharmacology, Bertran P.E Katzung, Emeritus.